

从出现症状到诊断的典型过程


诊断时间:

< 1 年


1 - 3 年

3 - 10 年

> 10 年



每 10 人中...



... 一年内只有十分之四的人被诊断出来

四分之三的人被告知他们的症状不是心脏病

75%



超过一半 (59%) 的受访者因非冠脉梗阻性缺血性心脏病症状而叫救护车



三分之二的人未经急诊室治疗就出院

67%



100 名救护人员中只有 8 人了解非冠脉梗阻性缺血性心脏病

误诊

四分之一的受访者服用了抗抑郁药

42%



三分之一的受访者被转介给精神科医生

32%



二分之一的受访者被告知症状是胃食管反流病

54%



6% 首次就诊时确诊

29% 进行了 2-3 次咨询

诊断前咨询

35% 进行了 4-6 次咨询

接受咨询的心脏病专家人数

20%



26%



50%



25% 进行了超过 6 次咨询

49%

近一半的受访者目前正在接受非冠脉梗阻性缺血性心脏病专家的护理

Martha Gulati, Najah Khan, Maria George, Colin Berry, Alaide Chieffo, Paolo G. Camici, Filippo Crea, Juan-Carlos Kaski, Mario Marzilli, C. Noel Bairey Merz

doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.09.047

Posters by Alex Koch

www.INOCAInternational.com

Scan for paper

