


与非冠脉梗阻性缺血性心脏病一起生活的影响

我们的受访者表示，
症状出现后他们的整体健康状况是....




工作



非冠脉梗阻性缺血性心脏病对十分之七的患者的工作生活产生了不利影响

 56% 的人因非冠脉梗阻性缺血性心脏病症状而减少了工作时间



48% 提前退休




38% 申请残疾




33% 由于非冠脉梗阻性缺血性心脏病的原因，担任了薪水较低的职位

非冠脉梗阻性缺血性心脏病受到不利影响...

 家庭生活 (81%)

 与伴侣的关系 (54%)

 性生活 (56%)




社会健康

十分之八的人表示非冠脉梗阻性缺血性心脏病对他们的社交生活产生了不利影响



精神健康

非冠脉梗阻性缺血性心脏病对十分之七的患者的生活前景产生了负面影响



非冠脉梗阻性缺血性心脏病影响了十分之七的患者的心理健康



Martha Gulati, Najah Khan, Maria George, Colin Berry, Alaide Chieffo, Paolo G. Camici, Filippo Crea, Juan-Carlos Kaski, Mario Marzilli, C. Noel Bairey Merz

doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.09.047

Posters by Alex Koch

www.INOCAInternational.com

Scan for paper

