

Diagnose

91% van de respondenten in de enquête waren vrouwen. Dit zou kunnen betekenen dat mannen minder geneigd zijn om zich bij ondersteuningsgroepen aan te sluiten.


De meeste respondenten (65%) waren tussen de 40 en 60 jaar oud, wat ook wijst op de rol van veroudering, de menopauze en hormonale invloeden bij INOCA-aandoeningen.



“Wat betreft het beïnvloeden van de prognose, bevindt men zich als clinicus in een veel betere positie om behandelingen te geven in een vroeg stadium van de natuurlijke geschiedenis, met andere woorden, wanneer de patiënt zich voor het eerst presenteert met symptomen en niet 5 of 10 jaar later.” ”

Prof Colin Berry

Leeftijd bij de diagnose



Mannen

Vrouwen




38% van de vrouwen meldde een verandering in symptomen bij de menopauze

“De vermindering van hormonen lijkt een nadelig effect te hebben,” ”

Prof Peter Collins

Diagnoses



* Als een percentage van vrouwen die de menopauze hebben doorgemaakt.

** Sommige respondenten hadden meer dan één diagnose

Martha Gulati, Najah Khan, Maria George, Colin Berry, Alaide Chieffo, Paolo G. Camici, Filippo Crea, Juan-Carlos Kaski, Mario Marzilli, C. Noel Bairey Merz

doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.09.047

Posters by Alex Koch

www.INOCAinternational.com

Scan voor papier

