


Een typische reis van de eerste symptomen tot aan de diagnose



3 op de 4 kregen te horen dat hun symptomen niet cardiaal waren

75%

Meer dan de helft (59%) van de respondenten belde een ambulance vanwege INOCA-symptomen

2 op de 3 werden ontslagen van de spoedeisende hulp zonder behandeling

67%



Verkeerde diagnoses

Slechts 8 van de 100 ambulancemedewerkers begrepen INOCA

1 op de 4 respondenten kreeg antidepressiva voorgeschreven

42%

1 op de 3 respondenten werd doorverwezen naar een psychiater

32%

1 op de 2 respondenten kreeg te horen dat de symptomen GERD waren

54%

6% werd bij het eerste consult gediagnosticeerd

29% had 2-3 consultaties

Consultaties vóór de diagnose

35% had 4-6 consultaties

Aantal geraadpleegde cardiologen

20%



26%



50%



25% had meer dan 6 consultaties

49%

Iets minder dan de helft van de respondenten staat momenteel onder behandeling van een INOCA-specialist

Martha Gulati, Najah Khan, Maria George, Colin Berry, Alaide Chieffo, Paolo G. Camici, Filippo Crea, Juan-Carlos Kaski, Mario Marzilli, C. Noel Bairey Merz

doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.09.047

gemaakt door Alex Koch

www.INOCAInternational.com

Scan voor papier

