

# Un recorrido típico desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico

Tiempo transcurrido hasta el diagnóstico



De cada 10 personas...


40%

23%

25%

10%

... solo 4 de cada 10 fueron diagnosticadas dentro de un año



A 3 de cada 4 les dijeron que sus síntomas no eran cardíacos

75%



Más de la mitad (59%) de los encuestados pidieron una ambulancia por síntomas de INOCA



2 de cada 3 fueron dados de alta sin tratamiento desde urgencias

67%



Sólo 8 de cada 100 equipos de ambulancia entendían INOCA

## Diagnósticos erróneos

A 1 de cada 4 encuestados se le recetó antidepresivos

42%



1 de cada 3 encuestados fue derivado a un psiquiatra

32%



A 1 de cada 2 encuestados le dijeron que los síntomas eran de GERD (ERGE)

54%



6% fueron diagnosticados en la primera consulta

29% tuvieron 2 – 3 consultas

Consultas previas al diagnóstico

35% tuvieron 4 – 6 consultas

## Número de cardiólogos consultados

20%



26%



50%



25% tuvieron más de 6 consultas

49%

Algo menos de la mitad de los encuestados se encuentran actualmente bajo la cuidado de un especialista de INOCA

Martha Gulati, Najah Khan, Maria George, Colin Berry, Alaide Chieffo, Paolo G. Camici, Filippo Crea, Juan-Carlos Kaski, Mario Marzilli, C. Noel Bairey Merz

[doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.09.047](https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.09.047)

Afiches por Alex Koch  
www.INOCAInternational.com

Escanear para ver el estudio

